

# Manual DASTI

## Depression bei Aphasie nach Schlaganfall – Testinstrument

Deutsche Übersetzung des SADQ-H10 (Stroke Aphasic Depression Questionnaire 10-item Hospital version, Lincoln et al. 2000)

**Frühester Untersuchungszeitpunkt:** 2 Wochen nach dem Ereignis

**Durchführungsdauer:** 5 Minuten

**Testleiter:**

- Pflege-/Reha-/ Ärzteteam in der Klinik
- Ehepartner, Pfleger, sonstige nahestehende Person zu Hause/ im Pflegeheim

**Auswertung:**

Es werden pro Frage Punktwerte von 0-3 vergeben. Dabei bedeutet 0 keine (depressive) Auffälligkeit und 3 deutliche (depressive) Auffälligkeit. Bei einem Gesamtpunktwert von  $\geq 6$  ist von einer Depression auszugehen und es Bedarf einer weiteren Beobachtung des Patienten.

**Erklärungen zu den einzelnen Fragen:**

1. Es geht um Episoden des Weinen, die möglicherweise wiederkehrend sind. Das Weinen ist weniger dramatisch, mehr trauernd, verglichen zu Frage 4.
2. Hier sind klassische Schlafstörungen gemeint. Sowohl Einschlaf- als auch Durchschlafstörungen.
3. Hier ist gemeint, ob der/ die Betroffene Ihnen in die Augen sieht, wenn Sie mit ihm/ ihr sprechen.
4. Hier ist ein dramatischeres Weinen als in Frage 1 gemeint. Es muss nicht unbedingt lange andauern (vgl. Pathologisches Weinen).
5. Der Betroffene gibt selbst zu verstehen (auch non-verbal), dass er Schmerzen hat. Es ist keine Reaktion auf Berührung.
6. Hier sind sowohl verbale als auch non-verbale Zeichen von Wut gemeint.
7. Hier sind keine Therapien (z.B. Sprachtherapie) gemeint. Es geht um Freizeitaktivitäten, die soziale Kontakte und das Treffen anderer Menschen beinhalten.
8. Hier geht es um Energielosigkeit, ein passives Nichtstun, obwohl dem/der Betroffenen evtl. etwas angeboten wird.
9. Hier ist motorische Unruhe gemeint, im Rahmen der körperlichen Einschränkungen (eventuelle Paresen).
10. Hier geht es um Selbstorganisation. Der Betroffene hat etwas zu tun, ist beschäftigt und hat Interesse an Dingen.